



## MENU DE EXAMES

EXAME	MATERIAL	RECOMENDAÇÕES AO PACIENTE
1,25 DIHIDROXI VITAMINA D	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
17 HIDROXIPREGNENOLONA	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 12 HORAS OU CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA.
17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA NEONATAL	SANGUE EM PAPEL FILTRO	INTERVALO MÁXIMO ENTRE AS MAMADAS. COLHER PREFERENTEMENTE DO 3º AO 30º DIA APÓS O NASCIMENTO E, NO MÁXIMO, ATÉ O 90º DIA. COLHER ANTES DO 3º DIA DE VIDA APENAS CASO EXISTA SOLICITAÇÃO MÉDICA. CASO O RECÉM-NASCIDO TENHA RECEBIDO TRANSFUSÃO SANGUÍNEA, O TEMPO IDEAL PARA A COLETA DESTES EXAMES NÃO ESTÁ BEM ESTABELECIDO E DEVE-SE COLHER CONFORME A ORIENTAÇÃO MÉDICA.
5 HIDROXITRIPTOFANO	URINA (24HS)	JEJUM DESEJÁVEL DE 4 HORAS.
ACETILCOLINA, ANTICORPO LIGADOR DO RECEPTOR	SORO	JEJUM DESEJÁVEL DE 4 HORAS.
ACETILCOLINESTERASE ERITROCITÁRIA	SANGUE (EDTA)	JEJUM NÃO OBRIGATORIO.
ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C)	PLASMA HEPARINA CONGELADO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
ACIDO FOLICO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ÁCIDO GAMA AMINOBUTIRICO	URINA (24HS)	COLETAR A URINA DE 24 HORAS: DESPREZAR A PRIMEIRA MICÇÃO E COLETAR TODAS AS URINAS FECHANDO O PERÍODO DE 24 HORAS. DESPREZAR A PRIMEIRA MICÇÃO E COLETAR TODAS AS URINAS FECHANDO O PERÍODO DE 24 HORAS. ARMAZENAR TAMPADO E REFRIGERADO DURANTE O INTERVALO DE COLETA.
ACIDO HIPURICO	URINA RECENTE LAVAR AS MÃOS ANTES DE COLHER.	COLHER URINA APÓS RETENÇÃO URINÁRIA DE 4 HORAS. FAZER HIGIENE DA GENITALIA COM AGUA E SABAO, SECAR, DESPREZAR O 1º JATO DE URINA, COLETAR O JATO MEDIO EM FRASCO MEDIO. INFORMAR SE E URINA INICIO OU FINAL DE JORNADA QUANDO FOR EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL. SE A AMOSTRA FOR POS JORNADA DE TRABALHO, COLHER AMOSTRA AO FINAL DO ÚLTIMO DIA DE TRABALHO DA SEMANA. EVITAR COLHER APOS A PRIMEIRA JORNADA DE TRABALHO DA SEMANA.
ACIDO MANDELICO	URINA RECENTE. COLHER URINA APOS RETENCAO URINÁRIA MÍNIMA DE 4 HORAS	LAVAR AS MÃOS, FAZER HIGIENE DA GENITARIA COM AGUA E SABAO, SECAR, DESPREZAR O 1º JATO DE URINA E COLETAR O JATO MEDIO EM FRASCO PROPRIO. COLHER AMOSTRA DE URINA AO FINAL DO ÚLTIMO DIA DE JORNADA DE TRABALHO DA SEMANA. EVITAR A PRIMEIRA JORNADA DE TRABALHO DA SEMANA.
ACIDO METIL HIPURICO	URINA RECENTE LAVAR AS MÃOS ANTES DE COLHER.	COLHER URINA APÓS RETENÇÃO URINÁRIA DE 4 HORAS. FAZER HIGIENE DA GENITALIA COM AGUA E SABAO, SECAR, DESPREZAR O 1º JATO DE URINA, COLETAR O JATO MEDIO EM FRASCO MEDIO. INFORMAR SE E URINA INICIO OU FINAL DE JORNADA QUANDO FOR EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL. SE A AMOSTRA FOR POS JORNADA DE TRABALHO, COLHER AMOSTRA AO FINAL DO ÚLTIMO DIA DE TRABALHO DA SEMANA. EVITAR COLHER APOS A PRIMEIRA JORNADA DE TRABALHO DA SEMANA.
ÁCIDO METILMALÔNICO	SORO	RECOMENDAVEL JEJUM DE NO MÍNIMO 8 HORAS. INFORMAR MEDICAMENTO EM USO.
ACIDO TRANS-MUCONICO	URINA	ISENTA DE ALIMENTOS QUE CONTENHAM ÁCIDO SÓRBICO (SORBATO) EM SUA COMPOSIÇÃO. COLETAR A PARTIR DO 3º DIA SEGUIDO DE EXPOSIÇÃO AO BENZENO.

ACIDO TRICLOROACETICO	URINA	URINA RECENTE. O CONSUMO DE ÁLCOOL PODE REDUZIR A EXCREÇÃO URINÁRIA DESTES PRODUTOS DEVIDO A EXCREÇÃO URINÁRIA DESTES PRODUTOS DEVIDO A INIBIÇÃO DA BIOTRANSFORMAÇÃO. LAVAR AS MÃOS ANTES DE COLHER. COLHER URINA APÓS RETENÇÃO URINÁRIA MÍNIMA DE 4 HORAS. LAVAR AS MÃOS, FAZER
ACIDO URICO	SORO	JEJUM NAO OBRIGATORIO. EM PACIENTES EM USO DE N-ACETILCISTEINA (NAC) OU METAMIZOL (DIPIRONA) , A PUNÇÃO VENOSA DEVE SER REALIZADA ANTES DE SUA ADMINISTRACAO DEVIDO A POSSIBILIDADE DE OCORREREM RESULTADOS FALSAMENTE REDUZIDO.
ACIDO URICO AMOSTRA ISOLADA	URINA	MATERIAL: URINA COLHER PREFERENCIALMENTE NO LABORATÓRIO A 1ª URINA DA MANHÃ OU COM INTERVALO DE 4 HORAS ENTRE AS MICÇÕES. FAZER HIGIENE DA GENITÁLIA COM AGUÁ E SABÃO, SECAR, DESPRESAR O 1º JATO DE URINA E COLETAR O JATO DO MEIO.
ACIDO VALPROICO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATORIO.
ÁCIDO VANILMANDELICO	URINA (24HS)	DIETA E ORIENTAÇÃO: O PACIENTE DEVERÁ PERMANECER 24 HORAS ANTES E DURANTE A COLETA SEM INGERIR OS ALIMENTOS COMO CAFÉ, CHÁ, REFRIGERANTE DE COLA E FUMO, POIS ESTES PODEM INTERFERIR NO RESULTADO. O CLIENTE DEVERÁ MANTER SUA ROTINA DIÁRIA EVITANDO FAZER ESFORÇO FÍSICO DURANTE A COLETA. NÃO É NECESSÁRIO AUMENTAR A INGESTÃO DE LÍQUIDOS, EXCETO SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA. INFORMAR HORÁRIO INICIAL E FINAL DA COLETA, PESO, MEDICAMENTOS EM USO, DOSAGEM, DIA E HORA DA ÚLTIMA DOSE.
ÁCIDOS ORGÂNICOS	URINA	JEJUM DESEJAVEL DE 4 HORAS.
ADENOSINA DE AMINASE (ADA)	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ALBUMINA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ALBUMINA LIQUIDO ASCITICO	DIVERSOS (LÍQUIDO ASCÍTICO, LIQUIDO PERITONIAL E LIQUOR)	A COLETA DO MATERIAL É UM PROCEDIMENTO MÉDICO.
ALDOSTERONA (MINERALOCORTICÓIDE)	SORO CONGELADO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ALFA 1 -ANTITRIPSINA FECAL	FEZES	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ALFA 2 MACROGLOBULINA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ALFA ANTI TRIPSINA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ALFA FETOPROTEÍNA (AFP)	SORO	JEJUM DESEJAVEL DE 4 HORAS.
ALUMINIO	SORO (TUBO TRACE)	JEJUM NAO OBRIGATORIO. EM CASO DE PACIENTE QUE FAZEM HEMODIALISE, A COLETA DEVE SER REALIZADA PRECEDENDO A SESSAO DE DIALISE, ANTES DA HEPARINIZACAO DO PACIENTE, AO FINAL DO MAIOR PERIODO INTERDIALITICO OU CONFORME ORIENTACAO MÉDICA.
AMILASE	SORO	JEJUM NAO OBRIGATORIO.
AMONIA	PLASMA (HEPARINA)	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
ANÁLISE DE LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO	LCR	Jejum não necessário. Agendar coleta.
ANCA P/ANCA C	SORO	JEJUM OBRIGATORIO DE 8 HORAS. INTERVALO MÁXIMO ENTRE MAMADAS PARA LACTENTES.
ANDROSTENEDIONA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ANTI - RNP	SORO	JEJUM ACONSELHVEL DE 4 HORAS.
ANTI - TPO (ANTIMICROSSOMAL)	SORO	JEJUM ACONSELHVEL DE 4 HORAS.
ANTI CCP	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ANTI -CCP URINA	URINA (24HS)	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ANTI DNA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ANTI- HBS	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ANTI HCV	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ANTI ILHOTA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ANTI JO1	SORO	INTERVALO ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES.
ANTI MAG IGG	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ANTI MAG IGM	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ANTI MULERIANO	SORO CONGELADO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ANTI MUSCULO LISO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIA.
ANTI SM	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
ANTI SSA - RO	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
ANTI TIREOGLOBULINA	SORO	JEJUM DESEJÁVEL DE 4 HORAS.
ANTI TRANSGLUTAMINASE IGA	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
ANTI TRANSGLUTAMINASE IGG	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS. INTERVALO MÁXIMO ENTRE AS MAMADAS PARA LACTENTES.
ANTICARDIOLIPINA - IGA	SORO	JEJUM ACONSELHVEL DE 4 HORAS.

ANTICARDIOLIPINA - IGG	SORO	JEJUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS.
ANTICARDIOLIPINA - IGM	SORO	JEJUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS.
ANTICORPO ANTI PM/SCL	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
ANTICORPOS ANTI DESMOGLEINA	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
ANTICORPOS ANTI GAD	SORO	JEJUM DESEJÁVEL DE 4 HORAS.
ANTICORPOS ANTI LEISHMANIOSE IGG E IGM	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ANTICORPOS ANTI PNEUMOCOCOS IGG	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
ANTICORPOS ANTI RAIVA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ANTICORPOS ANTI RICKETTSIA RICKETTSII IGG	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
ANTICORPOS ANTI RICKETTSIA RICKETTSII IGM	SORO	SANGUE JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
ANTICORPOS ANTIENDOMISIO - IGA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ANTICORPOS ANTIENDOMISIO - IGG	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ANTICORPOS ANTIENDOMISIO -IGM	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ANTIÍGENO NS1	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ANTI GLIADINA (GLÚTEN) - IGA	SORO	JEJUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS.
ANTI GLIADINA (GLÚTEN) - IGG	SORO	JEJUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS.
ANTI GLIADINA (GLÚTEN) - IGM	SORO	JEJUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS.
ANTIMITOCONDRIA	SORO	JEJUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS.
ANTI TROMBINA III	PLASMA (CITRATO)	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
APOLIPOPROTEÍNA A (APO A)	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
APOLIPOPROTEÍNA B (APO B)	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ARSENICO	URINA	DIETA: DURANTE OS 3 DIAS QUE ANTECEDEM A COLETA DA AMOSTRA, RECOMENDA-SE NÃO INGERIR FRUTOS DO MAR. NÃO COLHER EM LOCAL DE TRABALHO.
ARSENIO SERICO	SANGUE TOTAL (TRACE) (HEPARINA)	JEJUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS. DIETA: NÃO INGERIR FRUTOS DO MAR TRÊS DIAS ANTES DA COLETA.
ASLO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ASPERGILLUS FUMIGATUS (M3)	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
AVIDEZ DE IGG PARA TOXOPLASMOSE	SORO	JEJUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS.
BETA 2 GLICOPROTEINA IGA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
BETA 2 GLICOPROTEINA IGG E IGM	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
BETA 2 MICROGLOBULINA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
BETA CAROTENO	SORO CONGELADO AMBAR	JEJUM OBRIGATORIO DE 8 HORAS.
BETA HCG	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
BILIRRUBINAS (DIRETA, INDIRETA E TOTAL) - PESQUISA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
BIOPSIA	DIVERSOS	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
BIOPSIA (2 PEÇAS)	DIVERSOS	JEJUM NÃO NECESSÁRIO.
BIOTINIDASE QUANTITATIVA	PLASMA (HEPARINA)	JEJUM DESEJÁVEL DE 4 HORAS.
BRUCELOSE IGG	SORO	JEJUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS.
BRUCELOSE IGM	SORO	JEJUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS.
CA125	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
CA15-3	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
CA199	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
CA-50	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
CA724	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
CALCIO - URINA 24 HORAS	URINA (24HS)	A DIETA SERÁ ORIENTADA SOMENTE SE FOR SOLICITADA PELO MÉDICO. CASO CONTRÁRIO, A COLETA SERÁ FEITA SEM DIETA. SE COM DIETA, FAVOR ESPECIFICAR. DIETA POBRE EM CÁLCIO (SUGERIDA OU CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA): PERMANECER 4 DIAS SEM INGERIR OS SEGUINTE ALIMENTOS: LEITE E SEUS DERIVADOS (MANTEIGA, QUEIJO, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, ETC) COLETAR A URINA DE 24 HORAS DO 3º PARA O 4º DIA, PERMANECENDO SOBRE DIETA. NÃO COLHER DURANTE O PERÍODO DE COLICA RENAL OU EM USO DE MEDICAMENTOS. NESTE CASO, ESPERAR 10 DIAS (CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA). NÃO FAZER ESFORÇO FÍSICO DURANTE A COLETA. O CLIENTE DEVE MANTER SUA ROTINA DIÁRIA. NÃO É NECESSÁRIO AUMENTAR A INGESTÃO DE LÍQUIDOS, EXCETO SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA.

CALCIO AMOSTRA ISOLADA	URINA	COLHER PREFERENCIALMENTE NO LABORATÓRIO A 1ª URINA DA MANHÃ OU COM INTERVALO DE 4 HORAS ENTRE AS MICÇÕES. FAZER HIGIENE DA GENITÁLIA COM ÁGUA E SABÃO, SECAR, DESPREZAR O 1º JATO DE URINA E COLETAR O JATO DO MEIO. SENDO A COLETA FEITA EM CASA, TRAZER O MATERIAL AO LABORATÓRIO NO PRAZO MÁXIMO DE 1 HORA.
CALCIO IONICO	SORO	JEJUM NAO OBRIGATORIO.
CALCIO SERICO	SORO	JEJUM NAO OBRIGATORIO
CALCITONINA	SORO CONGELADO	JEJUM NAO OBRIGATORIO.
CALCULO RENAL	CÁLCULO URINÁRIO	O MATERIAL É ELIMINADO ESPONTANEAMENTE OU POR EXTRAÇÃO CIRÚRGICA. NÃO REALIZAMOS A COLETA DO MATERIAL POIS TRATA-SE DE UM PROCEDIMENTO MÉDICO.
CAPACIDADE LATENTE DE FIXAÇÃO DE FERRO	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
CAPACIDADE TOTAL DE LIGAÇÃO DO FERRO	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
CARBAMAZEPINA	SORO	JEJUM ALIMENTAR DESEJAVEL DE 4 HORAS OUI CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA
CARIÓTIPO 100 CÉLULAS	SANGUE	LAUDO MÉDICO
CARIÓTIPO 50 CÉLULAS	SANGUE	LAUDO MÉDICO
CARIOTIPO COM BANDA G	SANGUE (HEPARINA)	JEJUM NAO OBRIGATORIO.
CATECOLAMINAS, URINA 24 HORAS	URINA (24HS)	O CLIENTE DEVERÁ PERMANECER 24 HORAS ANTES E DURANTE A COLETA SEM INGERIR ALIMENTOS COMO: CAFÉ, REFRIGERANTES COM COLA E FUMO, UMA VEZ QUE ESTES INTERFEREM NO RESULTADO. O CLIENTE DEVERÁ MANTER SUA ROTINA DIÁRIA EVITANDO FAZER ESFORÇO FÍSICO DURANTE A COLETA. NÃO É NECESSÁRIO AUMENTAR A INGESTÃO DE LÍQUIDOS, EXCETO SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA. INFORMAR HORÁRIO INICIAL E FINAL DA COLETA, PESO, MEDICAMENTO EM USO, DOSAGEM, DIA E HORA DA ÚLTIMA DOSE. CASO O CLIENTE FAÇA USO CONTÍNUO DE ALGUM MEDICAMENTO, DEVE ENTRAR EM CONTATO COM O MÉDICO PARA AVALIAR A SUSPENSÃO DO MESMO. A SUSPENSÃO, ASSIM COMO SEU PERÍODO, FICA EXCLUSIVAMENTE A CRITÉRIO MÉDICO.
CAXUMBA IGG	SORO	JEJUM OBRIGATORIO DE 8 HORAS.
CAXUMBA IGM	SORO	JEJUM OBRIGATORIO DE 8 HORAS.
CEA	SORO	JEJUM NAO OBRIGATORIO.
CELULAS LE	SORO (TUBO TRACE)	JEJUM OBRIGATORIO DE 8 HORAS. INTERVALOS ENTRE MAMADAS PARA LACTENTES
CELULAS NK (CD56)	SANGUE (EDTA)	JEJUM NAO OBRIGATORIO.
CENTROMERO , ANTICORPOS ANTI	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS. INTERVALO ENTRE MAMADAS PARA LACTENTES.
CERULOPLASMINA	SORO	JEJUM NAO OBRIGATORIO.
CHAGAS IGG	SORO	JEJUM DESEJÁVEL DE 4 HORAS.
CHIKUNGUNYA IGG E IGM	SORO	JEJUM NAO OBRIGATORIO.
CHLAMYDIA TRACHOMATIS E NEISSERIA GONORRHOEAE - PC	URINA	1º JATO: COLHER PREFERENCIALMENTE NO MANHÃ. FAZER HIGIENE DA GENITALIA COM AGUA E SABAO, SECAR, E COLETAR O 1º JATO DE URINA EM URINA. URINA JATO MÉDIO: COLHER PREFERENCIALMENTE NO LABORATÓRIO A 1ª URINA DA MANHÃ OU COM INTERVALO GENITÁLIA COM ÁGUA E SABÃO. SECAR, DESPREZAR O 1º JATO DE
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG	SORO REFRIGERADO	JEJUM ACONSELHABEL DE 4 HORAS.
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM	SORO REFRIGERADO	JEJUM ACONSELHABEL DE 4 HORAS.
CHLAMYDIA TRACHOMATIS-NEISSERIA GONORRHOEAE (PCR)	DIVERSOS	ABSTINÊNCIA SEXUAL DE 72 HORAS ANTES DA COLETA, NÃO UTILIZAR DUCHAS OU CREMES 48 HORAS ANTES DA COLETA, PARA MULHERES, DE PREFERÊNCIA, NÃO ESTAR MENSTRUADA; FAÇA A COLETA APÓS 3 HORAS DA ÚLTIMA MICÇÃO.
CHUMBO SÉRICO	SANGUE (HEPARINA)	JEJUM NAO OBRIGATORIO.
CHUMBO URINÁRIO	URINA	LAVAR AS MÃOS ANTES DE COLHER. COLHER URINA A POS RETENÇÃO URINÁRIA DE 4 HORAS. FAZER HIGIENE DA GENITÁLIA COM ÁGUA E SABÃO, SECAR, DESPREZAR O 1º JATO DA URINA, COLETAR O JATO MÉDIO EM FRASCO PRÓPRIO. NÃO COLHER EM LOCAL DE TRABALHO. RETIRAR O UNIFORME DE TRABALHO ANTES DA COLETA. ENTREGAR A URINA NO LABORATÓRIO ATÉ 2 HORAS APÓS A COLETA. ESPECIFICAR TIPO DE URINA COLHIDA, SE INÍCIO OU FINAL DE JORNADA. RECOMENDA-SE COLETAR AMOSTRA DE FINAL DE JORNADA.
CISTINA - URINA 24 HORAS	URINA (24HS)	NÃO FAZER ESFORÇO FÍSICO DURANTE A COLETA.
CITOLOGIA ONCÓTICA	CITOLOGIA DE COLO DE UTERO, ECTO E ENDOCERVICAL	DURANTE O EXAME A MULHER NÃO DEVE TER RELAÇÕES SEXUAIS (MESMO COM CAMISINHA) NO DIA ANTERIOR AO EXAME. EVITAR O USO DE DUCHAS, MEDICAMENTOS VAGINAIS E ANTICONCEPCIONAL LOCAIS NAS 48 HORAS ANTERIORES À REALIZAÇÃO DO EXAME
CITOLOGIA RASPADO URETRAL	DIVERSOS	1ª URINA DA MANHÃ: FAZER HIGIENE ANTES DA COLETA E COLHER TODO O VOLUME URINÁRIO EM FRASCO APROPRIADO. URINA 24 HORAS: COLETA CONFORME ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS. REFRIGERAR DURANTE TODO O PROCEDIMENTO DE COLETA. DEMAIS CONDIÇÕES DEVEM SER COLHIDOS PELO MÉDICO.
CITOLOGIA URINARIA	URINA	ACONSELHA-SE O DESCARTE DA PRIMEIRA URINA MATINAL E COLETA DA PRÓXIMA MICÇÃO APÓS RETENÇÃO DE APROXIMADAMENTE 3 A 4 HORAS.
CITOMEGALOVÍRUS IGG	SORO	JEJUM NAO OBRIGATORIO.
CITOMEGALOVÍRUS IGM	SORO	JEJUM NAO OBRIGATORIO.
CLEARANCE DE CREATININA	SORO + URINA 24H	- Jejum de 4 horas para a coleta do sangue. - Urina deverá ser mantida obrigatoriamente sob refrigeração ao logo da coleta de 24hs.
CLEARANCE DE UREIA	SORO + URINA 24H	Nota: A coleta do sangue deverá ser feita no mesmo dia de entrega da urina. Atenção ao preenchimento de dados adicionais. JEJUM NAO OBRIGATORIO. INFORMAR VOLUME URINARIO, PESO, ALTURA E TEMPO DE COLETA (EM HORAS). REFRIGERAR A URINA DESDE O INÍCIO DA COLETA. NÃO FAZER ESFORÇO FÍSICO DURANTE A COLETA

CLONAZEPAM	SORO	JEIUM NAO OBRIGATORIO OU CONFORME ORIENTACAO MEDICA.
CLORO	SORO	JEIUM NAO OBRIGATORIO.
COAGULOGRAMA	PLASMA (CITRATO)	JEIUM DESEJAVEL 4 HORAS. INFORMAR SE ESTA OU ESTEVE RECENTEMENTE EM USO DE ANTICOAGULANTE E QUAL A DOSAGEM. INFORMAR HISTORIA DE SANGRAMENTOS IMPORTANTES ANTERIORES, DOENCAS DE COAGULACAO NA FAMILIA E TESTES DE COAGULACAO ALTERADOS PREVIAMENTE.
COBALTO	SORO	JEIUM NAO OBRIGATORIO.
COBRE URINA 24 HORAS	URINA (24HS)	REFRIGERAR DURANTE TODO O PROCEDIMENTO DE COLETA. NÃO COLHER EM LOCAL DE TRABALHO. RETIRAR A ROUPA OU UNIFORME CONTAMINADO ANTES DA COLETA.
COCAINA	URINA	JEIUM NAO OBRIGATORIO. A COLETA DEVE SER OBRIGATORIAMENTE ASSISTIDA.
COLESTEROL HDL	SORO	JEIUM SUGERIDO DE 12 HORAS.
COLESTEROL LDL	SORO	JEIUM SUGERIDO DE 12 HORAS. BEBIDA ALCOÓLICA: A ABSTINÊNCIA É DESEJAVEL NAS 72 HORAS QUE ANTECEDEM O TESTE.
COLESTEROL TOTAL	SORO	JEIUM SUGERIDO DE 12 HORAS.
COLINESTERASE	SORO	JEIUM NAO OBRIGATORIO.
COLPOCITOLOGICO	MATERIAL CÉRVICO VAGINA	PARA GARANTIR UM RESULTADO PRECISO, A MULHER NÃO DEVE TER RELAÇÕES SEXUAIS (MESMO COM CAMISINHA) NO DIA ANTERIOR AO EXAME. EVITAR O USO DE DUCHAS, MEDICAMENTOS VAGINAIS E ANTICONCEPCIONAL LOCAIS NAS 48 HORAS ANTERIORES À REALIZAÇÃO DO EXAME. É IMPORTANTE TAMBÉM QUE NÃO ESTEJA MENSTRUADA, PORQUE A PRESENÇA DE SANGUE PODE ALTERAR O RESULTADO.
COMPLEMENTO C2	SORO	JEIUM OBRIGATORIO DE 8 HORAS. INTERVALO ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES.
COMPLEMENTO C4	SORO	JEIUM NAO OBRIGATORIO.
COMPLEMENTO CH-50	SORO	JEIUM NAO OBRIGATORIO.
COOMBS DIRETO	SANGUE (EDTA)	JEIUM NAO OBRIGATORIO.
COOMBS INDIRETO	SORO	JEIUM NAO OBRIGATORIO. INFORMAR SE CLIENTE ESTA GRÁVIDA, MES DE GESTACAO E NUMERO DE FILHOS, SE OUVER.
COPROCULTURA	FEZES	COLHER FEZES RECEM EXCRETADAS ANTES DA ADMINISTRAÇÃO DE ANTIMICROBIANOS. A POSITIVIDADE DAS COPROCUITURAS É MAIOR QUANDO A AMOSTRA É COLHIDA NOS PRIMEIROS DIAS DA DOENÇA.
COPROPORFIRINAS URINARIAS	URINA REFRIGERADA	COLHER PREFERENCIALMENTE NO LABORATÓRIO A 1ª URINA DA MANHÃ OU COM INTERVALO DE 4 HORAS ENTRE AS MICÇÕES. FAZER HIGIENE LOCAL COM ÁGUA E SABÃO, SECAR, DESPREZAR O 1º JATO E COLHER O JATO MÉDIO. UTILIZAR FRASCO LIMPO E PRÓPRIO PARA COLETA DE URINA (PROTEGIDO DA LUZ)
COQUELUCHE IGG	SORO	JEIUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS.
COQUELUCHE IGM	SORO	JEIUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS.
CORONAVÍRUS DETECÇÃO POR PCR (COVID19)	SECREÇÃO NASOFARINGE/OROFARINGE	EVITAR O USO DE SPRAYS NASAIS E OUTROS MEDICAMENTOS DE USO LOCAL NO DIA DA COLETA.
CORTISOL	SORO	JEIUM NAO OBRIGATORIO. INFORMAR HORARIO DA COLETA.
CORTISOL (CURVA)	SORO	INFORMAR MEDICAMENTO EM USO (INCLUSIVE POMADAS E CREMES) DIA HOJA DA ULTIMA DOSE.
CORTISOL APÓS SUPRESSAO COM DEXAMETASONA	SORO	JEIUM NAO OBRIGATORIO. INFORMAR MEDICAMENTO EM USO (INCLUSIVE POMADAS E CREMES) DIA HOJA DA ULTIMA DOSE.
CORTISOL URINÁRIO	URINA (24HS)	JEIUM NAO OBRIGATORIO.
COVID-19 - PESQUISA DE ANTICORPOS IgG/IgM	SORO	NÃO LEVANTAR PELA MANHÃ, DEVERA DESPREZAR TODA A URINA CONTIDA NA BEXIGA E ANOTAR O HORARIO. A PARTIR DESSE MOMENTO, TODA VEZ QUE URINAR, DURANTE O RESTO DO DIA E TAMBÉM À NOITE, DEVE SE RECOLHER INTEGRALMENTE A URINA DE CADA MICÇÃO, COLOCANDO-A NO MESMO FRASCO DE COLETA. ESTE
COVID-19 IMUNOCROMAOGRAFIA - ANTIGENO	SANGUE	JEIUM NAO OBRIGATORIO. COLETAR O SORO A PARTIR DO 10º DIA DE SINTOMAS
CREATININA	SORO	COLETAR O SANGUE A PARTIR DO 3º DIA DE SINTOMAS
CREATININA AMOSTRA ISOLADA	URINA	JEIUM NAO OBRIGATORIO. COLHER PREFERENCIALMENTE NO LABORATÓRIO A 1ª URINA DA MANHÃ. FAZER HIGIENE DA GENITÁLIA COM ÁGUA E SABÃO. SECAR, DESPREZAR O 1º JATO DE URINA E COLETAR O JATO MÉDIO, SENDO A
CREATININÚRIA	URINA (24HS)	NÃO FAZER ESFORÇO FÍSICO DURANTE A COLETA. O CLIENTE DEVE MANTER SUA ROTINA DIÁRIA. NÃO É NECESSÁRIO AUMENTAR A INGESTÃO DE LÍQUIDOS, EXCETO SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA. A HIGIENIZAÇÃO DA GENITÁLIA É REALIZADA COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO. NAS MULHERES, LAVAR E SECAR SEMPRE DE FRENTE PARA TRÁS. NOS HOMENS LAVAR RETRAINDO O PREPÚCIO PARA UMA ADEQUADA LIMPEZA DO MEATO URETRAL.
CREATINO FOSFOQUINASE -CKMB	SORO	JEIUM NAO OBRIGATORIO.
CREATINO FOSFOQUINASE TOTAL (CPK)	SORO	JEIUM NAO OBRIGATORIO.
CROMATOGRAFIA AMINOÁCIDOS	SANGUE EM PAPEL FILTRO	COLHER PREFERENCIALMENTE NO LABORATÓRIO A 1ª URINA DA MANHÃ OU COM INTERVALO DE 4 HORAS ENTRE AS MICÇÕES. FAZER HIGIENE LOCAL COM ÁGUA E SABÃO, SECAR, DESPREZAR O 1º JATO E COLETAR O JATO MÉDIO, DESPREZAR O TERCEIRO JATO. UTILIZAR FRASCO LIMPO E PRÓPRIO PARA COLETA DE URINA.
CROMATOGRAFIA DE AÇUCARES	URINA REFRIGERADA	COLHER PREFERENCIALMENTE NO LABORATÓRIO A 1ª URINA DA MANHÃ OU COM INTERVALO DE 4 HORAS ENTRE AS MICÇÕES. FAZER HIGIENE LOCAL COM ÁGUA E SABÃO, SECAR, DESPREZAR O 1º JATO E COLETAR O JATO MÉDIO, DESPREZAR O TERCEIRO JATO. UTILIZAR FRASCO LIMPO E PRÓPRIO PARA COLETA DE URINA.

CROMO URINARIO	URINA	LAVAR AS MÃOS ANTES DE COLHER COLHER URINA APÓS RETENÇÃO URINÁRIA DE 4 HORAS. FAZER HIGIENE DA GENITÁLIA COM ÁGUA E SABÃO, SECAR, DESPREZAR O 1º JATO DE URINA, COLETAR O JATO MÉDIO EM FRASCO PRÓPRIO. NÃO COLHER EM LOCAL DE TRABALHO. INFORMAR SE FAZ USO DE ALGUM MEDICAMENTO. INFORMAR SE ESTA EXPOSTO OCUPACIONALMENTE.
C-TELOPEPTÍDEO - CTX-I	PLASMA (EDTA)	JEJUM DE 8 HORAS.
CULTURA PARA FUNGOS	DIVERSOS	JEJUM NÃO NECESSÁRIO.
CURVA GLICÊMICA (5 DOSAGENS)	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 A 14 HORAS OU CONFORME PEDIDO MÉDICO. EM CASO DE CRIANÇAS, SEGUIR ORIENTAÇÃO MÉDICA.
CURVA INSULÍNICA	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 A 14 HORAS OU CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA. EM CASO DE CRIANÇA SEGUIR ORIENTAÇÃO MÉDICA.
D XILOSE	PLASMA (FLUORETO)	ADULTO: JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS. CRIANÇA: JEJUM OBRIGATÓRIO DE 4 HORAS.
DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 4 HORAS OU CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA.
DEHIDROTESTOSTERONA (DHT)	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 4 HORAS.
DENGUE - IGG E IGM	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
DIMERO D	PLASMA (CITRATO)	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
DISMORFISMO	URINA	FAZER HIGIENE LOCAL COM ÁGUA E SABÃO, SECAR, DESPREZAR O 1º JATO E COLETAR O JATO MÉDIO DA 2ª MICÇÃO MATINAL (COM RETENÇÃO URINÁRIA DE 2 A 4 HORAS). UTILIZAR FRASCO LIMPO E PRÓPRIO PARA COLETA DE URINA. MANTER DIETA HÍDRICA HABITUAL. PARA MULHERES: NÃO COLHER DURANTE O PERÍODO MENSTRUAL. QUANDO NO PEDIDO FOR SOLICITADO URINA ROTINA E DISMORFISMO ERITROCITÁRIO O IDEAL QUE SEJA REALIZADO NA MESMA COLETA. EVITAR EM DIAS DISTINTOS. O PACIENTE DEVERÁ PERMANECER 24 HORAS ANTES E DURANTE A COLETA SEM INGERIR ALIMENTOS COMO: CAFÉ, REFRIGERANTES COM COLA E FUMO. O PACIENTE DEVERÁ MANTER SUA ROTINA DIÁRIA EVITANDO FAZER EXERCÍCIO FÍSICO DURANTE A COLETA. NÃO É NECESSÁRIO AUMENTAR A INGESTÃO DE LÍQUIDOS.
DOPAMINA	PLASMA (EDTA)	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
DOSAGEM DE KAPPA E LAMBDA	SORO	INTERVALO ENTRE MAMADAS PARA LACTENTES.
ELETROFERESE DE PROTEÍNAS	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
ELETROFORESE DE LIPOPROTEÍNAS	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 12 HORAS.
ENZIMA CONVERSORA DA ANGIOTENSINA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
EPSTEIN BAAR -IGG	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
EPSTEIN BAAR IGM	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ERITROPOIETINA	SORO CONGELADO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ERROS INATOS DE METABOLISMO NA URINA	URINA/AMBAR/CONGELADO	JEJUM NÃO NECESSÁRIO. MEDICAÇÃO: NECESSÁRIO INFORMAR MEDICAMENTOS EM USO.
ESPERMOGRAMA	ESPERMA	PACIENTE DEVE PERMANECER EM ABSTINÊNCIA DE 5 DIAS PARA A COLETA DO EXAME. A COLETA PODERÁ SER REALIZADA EM CASA E DEVERÁ SER ENTREGUE AO LABORATÓRIO IMEDIATAMENTE.
ESQUISTOSSOMOSE	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS. INTERVALO ENTRE MAMADAS PARA LACTENTES.
ESTRADIOL	SORO	JEJUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS.
ESTRIOL	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ESTRIOL LIVRE	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ESTRONA	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
ETANOL	PLASMA (FLUORETO)	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
EXAME	MATERIAL	<b>Recomend. Paciente</b>
FATOR ANTINÚCLEO, (FAN)	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
FATOR DE NECROSE TUMORAL	SORO CONGELADO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
FATOR REUMATOIDE	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
FATOR V LEIDEN	SANGUE (EDTA)	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
FATOR VIII	PLASMA (CITRATO)	JEJUM DESEJÁVEL DE 4 HORAS.
FATOR VIII, VON WILLEBRAND	PLASMA (CITRATO)	PACIENTE: SANGUE JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
FENILALANINA	PLASMA	JEJUM: INTERVALO MÁXIMO ENTRE AS MAMADAS.
FENITOINA	SORO	JEJUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS. COLHER ANTES DE UMA DAS TOMADAS DO MEDICAMENTO (2 HORAS ANTES) OU CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA.
FENOBARBITAL	SORO	JEJUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS OU CONFORME ORIENTAÇÃO DO MÉDICO.
FENOL URINARIO	URINA	LAVAR AS MÃOS ANTES DE COLHER. COLHER URINA APÓS RETENÇÃO URINÁRIA DE 4 HORAS. FAZER HIGIENE DA GENITÁLIA COM ÁGUA E SABÃO, SECAR, DESPREZAR O 1º JATO DE URINA, COLETAR O JATO MÉDIO EM FRASCO PRÓPRIO.
FERRITINA	SORO	JEJUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS.
FERRO SÉRICO	SORO	ADULTO: JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
FIBRINOGÊNIO	PLASMA (CITRATO CONGELADO)	JEJUM DESEJÁVEL DE 4 HORAS.
FIBROSE CÍSTICA DELTA F 508	SANGUE (EDTA)	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
FILTRAÇÃO GLOMERULAR	SORO	JEJUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS.
FOSFATASE ÁCIDA FRAÇÃO PROSTÁTICA	SORO	JEJUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS.

FOSFATASE ÁCIDA TOTAL	SORO ACIDIFICADO	JEIUM ACONSELHAVÉL DE 4 HORAS. MEDICAÇÃO: CEFOXITINA E DOXICICLINA PODEM PROVOCAR RESULTADOS FALSAMENTE ELEVADOS.
FOSFORO	SORO	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
FOSFORO -URINA 24 HORAS	URINA (24HS)	HIGIENIZAR A REGIÃO GENITAL, DESPREZAR A PRIMEIRA MICHÃO DO DIA E, A PARTIR DA SEGUNDA MICHÃO, COLETAR TODAS AS URINAS ATÉ A PRIMEIRA MICHÃO DO DIA SEGUINTE, FECHANDO O PERÍODO DE 24 HORAS. ARMAZENAR TAMPADO E REFRIGERADO DURANTE O INTERVALO DE COLETA.
FRUTOSAMINAS	SORO	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
FSH	SORO	JEIUM NAO OBRIGATORIO.
FUNCIONAL DE FEZES	FEZES	RECENTE A FRECO ( TODO O VOLUME FECAL APÓS DIETA ESPECÍFICA. RECOMENDÁVEL SUSPENDER MEDICAÇÃO LAXANTE E/OU SUPPOSITÓRIO NOS 3 DIAS ANTERIORES E DURANTE A COLETA OU CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA. EVITAR O USO DE BEBIDAS GASOSAS (EX: REFRIGERANTES, ÁGUA GASEIFICADA) E ALCÓOLICAS DURANTE OS 3 DIAS QUE ANTECEDEM A COLETA. IMPORTANTE INFORMAR A IDADE. CRIANÇA ATÉ 12 ANOS NÃO NECESSITA DE DIETA. PARA MAIORES DE 12 ANOS, MANTER A DIETA HABITUAL COM AS RECOMENDAÇÕES (DESCRITAS ABAIXO) OU CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA. DIETA: MANTER DIETA HABITUAL (DIA A DIA DO CLIENTE) SENDO RECOMENDÁVEL NAS ÚLTIMAS 72 HORAS (3 DIAS) ANTES DA COLETA QUE O MESMO INCLUA NAS REFEIÇÕES PRINCIPAIS (ALMOÇO E/ OU JANTAR) QUANTIDADES USUAIS DE CARNE, BATATA E FEIJÃO E, NAS OUTRAS REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, LANCHE DA TARDE), MANTEIGA E
GAMA GT	SORO	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
GASOMETRIA	SANGUE TOTAL HEPARINIZADO ARTERIAL	JEIUM NÃO NECESSÁRIO.
GASTRINA	SORO CONGELADO	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
GLICOSE	SORO	Jejum de 8 horas
GLICOSE-6 FOSFATO DESIDROGENASE G6PD	SANGUE (EDTA)	JEIUM DESEJAVEL DE 4 HORAS.
GLOBULINA DE LIGAÇÃO DE HORMÔNIOS SEXUAIS (SHBG)	SORO	JEIUM ACONSELHABEL DE 4 HORAS.
GLUTATIONA PEROXIDASE ERITROCITARIA	SANGUE (HEPARINA)	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
GONADOTROPINA CORIÔNICA	SORO	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
GORDURA FECAL	FEZES	ANTES DE COLETAR AS FEZES, SE NECESSÁRIO, LUBRIFICAR NO VASO SANITÁRIO PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO DO MATERIAL. EM CASOS DE CRIANÇAS UTILIZAR COLETOR DE URINA SE NECESSÁRIO.
GRUPO SANGUINEO ABO/RH	SANGUE (EDTA)	JEIUM NÃO NECESSÁRIO.
HBC - IGM	SORO	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
HBC -IGG	SORO	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
HBC-TOTAL	SORO	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
HBSAG	SORO	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
HBSAG HOSPITAL	SORO	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
HELICOBACTER PYLORI - IGG	SORO REFRIGERADO	JEIUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
HELICOBACTER PYLORI, ANTICORPO IGG	SORO	JEIUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
HELICOBACTER PYLORI, ANTICORPO IGM	SORO	JEIUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
HEMATIMETRIA	SANGUE (EDTA)	JEIUM NÃO NECESSÁRIO.
HEMATOCRITO	SANGUE (EDTA)	JEIUM DESEJAVÉL DE 4 HORAS.
HEMOCULTURA	SANGUE	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
HEMOGLOBINA	SANGUE (EDTA)	JEIUM DESEJÁVEL DE 4 HORAS.
HEMOGLOBINA GLICADA (A1 TOTAL)	SANGUE (EDTA)	JEIUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS.
HEMOGLOBINOPATIAS	SANGUE (EDTA)	JEIUM: INTERVALO ENTRE AS MAMADAS.
HEMOGRAMA COMPLETO	SANGUE (EDTA)	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
HEPATITE A - IGM	SORO	JEIUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS.
HEPATITE A -IGG	SORO	JEIUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS.
HEPATITE B - (ANTI HBE)	SORO	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
HEPATITE B - HBEAG	SORO	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
HEPATITE C - DETECÇÃO POR PCR	PLASMA EDTA CONGELADO	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
HEPATITE C - QUANTIFICAÇÃO POR PCR	PLASMA EDTA CONGELADO	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
HEPATITE E - IGM/IGG	SORO	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
HERPES SIMPLES - IGG	SORO	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
HERPES SIMPLES - IGM	SORO	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
HIV	SORO	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
HIV - PCR QUANTITATIVO EM TEMPO REAL	PLASMA (EDTA)	JEIUM NÃO NECESSÁRIO.
HIV HOSPITAL	SORO	JEIUM NÃO NECESSÁRIO.
HLA B27	SANGUE (EDTA)	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.

HLA DQ2 E DQ8 - DOENÇA CELÍACA	SANGUE (EDTA)	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
HOMOCISTEÍNA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
HORMÔNIO ADRENOCORTICOTRÓFICO, (ACTH)	PLASMA (EDTA)	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
HORMONIO DO CRESCIMENTO (GH)	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
HTLV	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
HVB - PCR QUANTITATIVO EM TEMPO REAL	PLASMA (EDTA)	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IFI PARA CHAGAS	SORO	JEJUM DESEJÁVEL DE 4 HORAS.
IGA	SORO	JEJUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS.
IGE COCHONILHA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE MULTIPLO (EX1)	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE MULTIPLO (EX2)	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE MULTIPLO (EX71)	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE MULTIPLO (EX72)	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE MULTIPLO (FX1)	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE MULTIPLO (FX2)	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE MULTIPLO (FX3) - CEREAIS	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE MULTIPLO (FX5)	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE MULTIPLO (FX7)	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE MULTIPLO (GX1)	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE MULTIPLO (GX2)	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE MULTIPLO (GX3)	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE MULTIPLO (GX4)	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE MULTIPLO (HX2)	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE MULTIPLO (MX1)	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE MULTIPLO (MX2)	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE MULTIPLO (TX1)	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE MULTIPLO (WX5)	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE MULTIPLO PARA TX7	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA AAS	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATORIO.
IGE PARA ABACAXI	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA ABELHA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA ABOBORA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA ACARO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA ALFA LACTOALBUMINA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATORIO.
IGE PARA ALHO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATORIO.
IGE PARA AMENDOIA	SORO	JEJUM NÃO NECESSÁRIO.
IGE PARA AMENDOIM	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA AMOXICILINA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA AMPICILINA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA ARROZ	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA ATUM	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA AVEIA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA BACALHAU	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA BANANA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA BARATA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA BARATA PERIPLANETA AMERICANA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA BATATA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA BETA LACTOGLOBULINA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA BLATELA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA BLOMIA TROPICAIS	SORO	JEJUM NÃO ESPECIFICO.
IGE PARA CACAU	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATORIO.
IGE PARA CAMARAO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.

IGE PARA CAO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA CARANGUEJO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA CARNE DE GALINHA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA CARNE DE VACA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA CARNE PORCO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA CASEINA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA CASTANHA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA CAVALO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA CEBOLA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA CEFALEXINA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA CENOURA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA CEVADA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA CHEDDAR	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA CLARA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA COCO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA DF	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA DICLOFENACO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA DIPIRONA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA DP	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA ERVAS	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA ERVILHA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA FEIJAO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA FOLHA DE TABACO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA FORMIGA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA FUNGO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA GATO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA GEMA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA GLUTEN	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA GRAMA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA GRAMINEAS	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA IBUPROFENO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA INALANTES	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA KIWI	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA LAGOSTA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA LARANJA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA LATEX	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA LEITE	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA LEITE DE CABRA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA LIDOCAINA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA LIMAO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA LULA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA MACA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA MAMAO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA MANGA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA MARACUJA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA MARIMBONDO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA MEL	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA MEXILHAO AZUL	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA MICRO CERAS (D3)	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA MILHO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA MORANGO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.

IGE PARA NOZ DO BRASIL	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA OSTRA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA OVO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA OVOALBUMINA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA OVOMUCOIDE	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA PEIXE	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA PELO DE VACA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA PENAS DE GALINHA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA PENAS DE PERIQUITO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA PENICILINA G	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA PENICILINA V	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA PEPINO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA PERNILONGO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA PESSEGO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA PIMENTA NEGRA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA PIMENTA VERDE	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA PO CASEIRO	SORO	JEJUM NÃO NECESSÁRIO.
IGE PARA POLEN	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA POLVO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA PRINCIPAIS ALERGENOS DO LEITE	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA QUEIJO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA RARA H1 (F422)	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA SALMAO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA SOJA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA SULFAMETOXAZOL	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA TILAPIA	SORO	JEJUM NÃO NECESSÁRIO.
IGE PARA TOMATE	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA TRIGO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE PARA UVA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGE TARTRAZINA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IGFBP3	SORO CONGELADO	JEJUM DESEJAVÉL DE 4 HORAS.
IGG	SORO	JEJUM ACONSELHAVÉL DE 4 HORAS.
IGM	SORO	JEJUM ACONSELHAVÉL DE 4 HORAS.
IMUNOFIXAÇÃO	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
IMUNOFIXAÇÃO DE PROTEINAS SERICAS	SORO	JEJUM DE 8 HORAS.
IMUNOFIXAÇÃO URINA RECENTE	URINA	COLHER PREFERENCIALMENTE NO LABORATÓRIO A 1ª URINA DA MANHÃ OU COM INTERVALO DE 4 HORAS ENTRE AS MICÇÕES. FAZER HIGIENE DA GELEadeira COM ÁGUA E SABÃO, SECAR, DESPREZAR O 1º JATO DE URINA E COLETAR O JATO DO MEIO. SENDO A COLETA FEITA EM CASA, TRAZER O MATERIAL AO LABORATÓRIO NO MÁXIMO DE 1 HORA.
IMUNOGLOBULINAS IGA, IGG, IGM	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
IMUNOGLOBULINAS IGM	SORO	JEJUM ACONSELHAVÉL DE 4 HORAS.
INDICAN URINARIO	URINA	COLHER 1ª URINA DA MANHÃ OU URINA COM O MÍNIMO DE 4 HORAS DE RETENÇÃO URINÁRIA. FAZER HIGIENE LOCAL COM ÁGUA E SABÃO, SECAR, DESPREZAR O 1º JATO E COLETAR O JATO DO MEIO.
INDICE DE HOMA BETA	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS A 14 HORAS OU CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA.
INDICE DE HOMA IR	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS A 14 HORAS OU CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA.
INDICE DE SATURACAO DE TRANSFERRINA	SORO	EM CASO DE CRIANÇAS, SEGUIR ORIENTAÇÃO MÉDICA.
INDICE QUICK	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
INIBIDOR C1 ESTERASE	SORO	JEJUM DE 8 HORAS.
INSULINA	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 A 14 HORAS OU CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA.
INSULINA 2 HORAS APÓS DEXTROSOL	SORO	EM CASO DE CRIANÇAS, SEGUIR ORIENTAÇÃO MÉDICA.
INSULINA PÓS-PRANDIAL	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 A 14 HORAS OU CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA.
INTERLEUCINA 6 (INTER 6)	SORO CONGELADO	EM CASO DE CRIANÇAS, SEGUIR ORIENTAÇÃO MÉDICA.
INTERLEUCINA 8	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ISOENZIMAS DE CPK	SORO	LABORATÓRIO 10 MINUTOS ANTES DA COLETA). AGUARDAR 2 HORAS, A PARTIR DO INÍCIO DA REFEIÇÃO E RETORNAR PARA COLHER O EXAME (CHEGAR AO LABORATÓRIO 10 MINUTOS ANTES DA COLETA).

LACTATO	PLASMA (FLUORETO)	JEJUM NÃO OBRIGATORIO. EM PACIENTES EM USO DE N-ACETILCISTEINA, REALIZAR A PUNÇÃO VENOSA ANTES DE SUA ADMINISTRAÇÃO DEVIDO A POSSIBILIDADE DE OCORREREM RESULTADOS FALSAMENTE REDUZIDOS.
LACTATO REPOUSO	PLASMA (FLUORETO)	JEJUM NÃO OBRIGATORIO. EM PACIENTES EM USO DE N-ACETILCISTEINA, REALIZAR A PUNÇÃO VENOSA ANTES DE SUA ADMINISTRAÇÃO DEVIDO A POSSIBILIDADE DE OCORREREM RESULTADOS FALSAMENTE REDUZIDOS.
LAMOTRIGINA	SORO (TUBO TRACE)	JEJUM ALIMENTAR DESEJÁVEL DE 4 HORAS OU CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA. INFORMAR MEDICAMENTOS EM USO, DOSAGEM, DIA E HORA DA ÚLTIMA DOSE. A COLETA IDEAL DEVE SER REALIZADA IMEDIATAMENTE ANTES DA ADMINISTRAÇÃO DA PRÓXIMA DOSE DE MEDICAMENTO OU CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA. CASO O MEDICAMENTO SEJA TOMADO APENAS UMA VEZ AO DIA, A COLETA DEVE SER FEITA PELO MENOS 12 HORAS APÓS A MEDICAÇÃO.
LEI	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
LEPTINA	SORO CONGELADO	JEJUM DESEJÁVEL DE 4 HORAS.
LEPTOSPIROSE IGG	SORO	JEJUM DESEJÁVEL DE 4 HORAS.
LEPTOSPIROSE IGM	SORO	JEJUM DESEJÁVEL DE 4 HORAS.
LEUCOGRAMA	SORO	JEJUM DESEJÁVEL DE 4 HORAS.
LH	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO. PARA MULHERES: A COLETA DO SANGUE DEVE PREFERENCIALMENTE SER REALIZADA ENTRE 2º E O 5º DIA DO CICLO MENSTRUAL, OU CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA.
LINFÓCITOS T <sup>+</sup> H <sup>+</sup> CONTAGEM DE (IF COM OKT-4) (CD-4+)	SANGUE (EDTA)	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
LINFÓCITOS SUPRESSORES CONTAGEM(IF COM OKT-8)(D8)	SANGUE (EDTA)	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
LIPÍDIOS TOTAIS	SORO	BEBIDA ALCÓOLICA : A ABSTINENCIA É DESEJÁVEL NAS 72 HORAS QUE ANTECEDEM O TESTE. JEJUM: JEJUM SUGERIDO DE 12 HORAS. EM CASOS DE TEMPOS ESPECÍFICOS OU SEM JEJUM FICA A CRITÉRIO MÉDICO OU POLÍTICA DO LABORATÓRIO.
LIPOPROTEÍNA A	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
LITIO	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATORIO. INFORMAR MEDICAMENTOS EM USO, DIA E HORA DA ÚLTIMA DOSE. A COLETA IDEAL DEVE SER REALIZADA IMEDIATAMENTE ANTES DA ADMINISTRAÇÃO DA PRÓXIMA DOSE DO MEDICAMENTO OU CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA.
LKM -1	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
LYME IGG	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
LYME IGM	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
MACRO PROLACTINA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
MAGNÉSIO -URINA 24 HORAS	URINA (24HS)	COLETAR A URINA DE 24 HORAS: DESPREZAR A PRIMEIRA MICÇÃO E COLETAR TODAS AS URINAS FECHANDO O PERÍODO DE 24 HORAS. ARMAZENAR TAMPADO E REFRIGERADO DURANTE O INTERVALO DE COLETA.
MANGANÊS	SORO (TUBO TRACE)	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
MERCURIO	SANGUE (HEPARINA)	LAVAR AS MÃOS ANTES DE COLHER. COLHER URINA APÓS RETENÇÃO URINÁRIA DE 4 HORAS.
METANEFRINAS PLASMÁTICAS	PLASMA EDTA CONGELADO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS OU A CRITÉRIO MÉDICO.
MICOLOGICO DIRETO	DIVERSOS	DESCAMAÇÃO DE LESÕES DE PELE, PELOS, UNHAS) O PACIENTE NÃO DEVE ESTAR EM USO DE ANTIFÚNGICOS DE USO TÓPICO OU ORAL NO MOMENTO DA COLETA. APÓS O USO DESTES MEDICAMENTOS, DEVE AGUARDAR, NO MÍNIMO, 15 DIAS PARA SE REALIZE A COLETA OU CONFORME ORIENTAÇÃO DO MÉDICO. POMADAS E CREMES COMUNS (LAVAR E REALIZAR A COLETA NO DIA SEGUINTE). ESMALTE (RETIRAR E VOLTAR APÓS NO MÍNIMO 72 HORAS PARA A COLETA). UNHA COM LIMPEZA EM MANICURE E PEDICURE (AGUARDAR 15 DIAS). NÃO TOMAR BANHO NO DIA DA COLETA. NÃO LAVAR O COURO CABELUDO OU REGIÃO DA BARBA NO DIA DA COLETA. ORIENTAR O PACIENTE A LAVAR E SECAR OS PÉS NO DIA ANTERIOR À COLETA E IR AO LABORATÓRIO COM CALÇADO FECHADO. SEMPRE QUE POSSÍVEL, INFORMAR A SUSPEITA MÉDICA PARA DIRECIONAR A PESQUISA.
MICROALBUMINÚRIA - URINA 24 HORAS	URINA (24HS)	REFRIGERAR A URINA DESDE O INÍCIO DA COLETA. NÃO FAZER ESFORÇO FÍSICO DURANTE O PERÍODO DA COLETA. O CLIENTE DEVE MANTER SUA ROTINA DIÁRIA. NÃO É NECESSÁRIO AUMENTAR A INGESTÃO DE LÍQUIDOS, EXCETO SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA.
MICROALBUMINURIA AMOSTRA ISOLADA	URINA	REFRIGERAR A URINA DESDE O INÍCIO DA COLETA. NÃO FAZER ESFORÇO FÍSICO DURANTE O PERÍODO DA COLETA. O CLIENTE DEVE MANTER SUA ROTINA DIÁRIA.
MICRODELEÇÃO NO CROMOSSOMO Y	SANGUE (EDTA)	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
MINERALOGRAMA	SANGUE (HEPARINA)	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 12 HORAS.
MINERALOGRAMA CAPILAR	DIVERSOS	CABELO CABELO TRATADOS RECENTEMENTE COM COSMÉTICOS (PERMANENTES, TINTURAS, DESCOLORAÇÃO, REFLEXO, ETC): AGUARDAR 10 SEMANAS ANTES DE COLETAR A AMOSTRA, POIS TRATAMENTOS QUÍMICOS PODEM ALTERAR OS NÍVEIS DE ALGUNS MINERAIS (CÁLCIO, MAGNÉSIO, ZINCO, COBRE, CHUMBO E NÍQUEL), PODENDO LEVAR A UMA INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DOS RESULTADOS. NÃO USAR GEL OU SIMILAR 24 HORAS ANTES DA COLETA. NÃO LAVAR OS CABELOS NO DIA DA COLETA. DURANTE OS CINCO DIAS QUE ANTECEDEM A COLETA OS CABELOS DEVEM SER LAVADOS DIARIAMENTE COM SHAMPOO NEUTRO (INFANTIL), DURANTE ESTA SEMANA O PACIENTE DEVE PROCEDER NORMALMENTE COM SUA ROTINA.
MIOGLOBINA	SORO	INÍCIO DO PROCEDIMENTO: ESVAZIAR A BEXIGA E JOGAR FORA TODA A URINA (ANOTAR O HORÁRIO). ESSE É O HORÁRIO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE COLETA. ATENÇÃO: A CONTAGEM DAS 24 HORAS COMEÇA AO ESVAZIAR A BEXIGA. A PRIMEIRA URINA MARCA O HORÁRIO DE INÍCIO DA COLETA E NÃO PODE SER ARMAZENADA NO FRASCO, DEVE SER JOGADA FORA. A PARTIR DA PRÓXIMA MICÇÃO, ARMAZENAR TODA A URINA DESSE DIA, DA NOITE E DO DIA SEGUINTE ATÉ O MESMO HORÁRIO EM QUE FOI DESPREZADA A PRIMEIRA URINA (ANOTAR). ESSE É O HORÁRIO DE TÉRMINO DO PROCEDIMENTO DE COLETA. ATENÇÃO: É IMPORTANTE RESPEITAR O HORÁRIO DE TÉRMINO, POIS SE A ÚLTIMA AMOSTRA DE URINA FOR COLETADA EM HORÁRIO DIFERENTE, O TEMPO DE COLETA NÃO SERÁ DE 24 HORAS. NÃO ESQUECER DE COLHER NENHUMA MICÇÃO. CASO ACONTEÇA, INTERROMPER A COLETA E INICIÁ-LA NOVAMENTE NO DIA SEGUINTE. QUALQUER ERRO NESTA COLETA, IMPLICARÁ EM ERRO NOS
MIOGLOBINA, PESQUISA E/OU DOSAGEM	URINA - JATO MÉDIO	O PACIENTE NÃO DEVE ESTAR EM USO DE MEDICAMENTO A BASE DE TODO OU DE VITAMINA C NOS 3 DIAS ANTERIORES A COLETA. A INTERRUPTÃO DO USO DO MEDICAMENTO SOMENTE PODERÁ SER FEITA COM O CONSENTIMENTO DO MÉDICO. CASO CONTRÁRIO APENAS RELATAR O USO. COLHER 1ª URINA DA MANHÃ OU URINA

MIOGLOBULINA 24 HORAS	URINA (24HS)	INÍCIO DO PROCEDIMENTO: ESVAZIAR A BEXIGA E JOGAR FORA TODA A URINA (ANOTAR O HORÁRIO); ESSE É O HORÁRIO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE COLETA.
MONONUCLEOSE	SORO	ATENÇÃO: A CONTAGEM DAS 24 HORAS COMEÇA AO ESVAZIAR A BEXIGA.
MORFOLOGIA ESTRITA DE KRUGER	ESPERMA	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
MTHFR	SANGUE (EDTA)	ABSTENÇÃO DE EJACULAÇÃO (RELAÇÃO SEXUAL, MASTURBAÇÃO E EJACULAÇÃO NOTURNA) DE 2 A 7 DIAS OU CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA. SE FOR CONTROLE DE VASECTOMIA NÃO É NECESSÁRIO A ABSTENÇÃO DE EJACULAÇÃO.
MUCOPROTEÍNAS	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
MUTACAO GENE PROTROMBINA	SANGUE (EDTA)	JEJUM NÃO NECESSÁRIO.
MUTAÇÃO V617F NO GENE JAK2	SANGUE (EDTA)	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
NIQUEL	SORO	JEJUM DESEJAVEL DE 4 HORAS.
NUCLEOTIDASE	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
OSMOLALIDADE	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
OSMOLALIDADE URINA	URINA	URINA RECENTE: COLHER PREFERENCIALMENTE NO LABORATÓRIO A 1º URINA DA MANHÃ OU COM INTERVALO DE 4 HORAS ENTRE AS MICÇÕES. FAZER HIGIENE DA GENITÁRIA COM ÁGUA E SABÃO, SECAR, DESPREZAR O 1º JATO DE URINA E COLETAR O JATO DO MEIO.
OXALATO URINARIO - URINA 24 HORAS	URINA (24HS)	COM CONSERVANTE HCL 25%.
OXCARBAZEPINA	SORO	DIETA: EVITAR LIMÃO, ARAÇÁXI, MORANGO, GELATINA, AÇEROLA, LARANJA, ESPINAFRE, TOMATE E DERIVADOS. JEJUM: EVITAR QUALQUER ALIMENTO OU JEJUM ALIMENTAR DESEJÁVEL DE 4 HORAS.
PARASITOLÓGICO - NAS FEZES - 1ª AMOSTRA	FEZES	MEDICAÇÃO: O USO DE LAXANTES É REALIZADO SOMENTE COM ORIENTAÇÃO MÉDICA E É INDICADO NOS CASOS EM QUE UMA SÉRIE DE EXAMES FOR NEGATIVO. O USO DE ANTIACIDOS E CONTRASTE ORAL TAMBÉM DEVE SER EVITADO. NECESSÁRIO ENVIO DE FEZES FRESCAS RECÉM ELIMINADAS COLETADAS EM FRASCO COLETOR LIMPO E SECO. COLETAR FRAÇÕES DE FEZES EM DIFERENTES PARTES DO BOLO FECAL.
PARASITOLÓGICO NAS FEZES	FEZES	MEDICAÇÃO: O USO DE LAXANTES É REALIZADO SOMENTE COM ORIENTAÇÃO MÉDICA E É INDICADO NOS CASOS EM QUE UMA SÉRIE DE EXAMES FOR NEGATIVO. O USO DE ANTIACIDOS E CONTRASTE ORAL TAMBÉM DEVE SER EVITADO. NECESSÁRIO ENVIO DE FEZES FRESCAS RECÉM ELIMINADAS COLETADAS EM FRASCO COLETOR LIMPO E SECO. COLETAR FRAÇÕES DE FEZES EM DIFERENTES PARTES DO BOLO FECAL.
PARASITOLÓGICO NAS FEZES - 1ª AMOSTRA	FEZES	MEDICAÇÃO: O USO DE LAXANTES É REALIZADO SOMENTE COM ORIENTAÇÃO MÉDICA E É INDICADO NOS CASOS EM QUE UMA SÉRIE DE EXAMES FOR NEGATIVO. O USO DE ANTIACIDOS E CONTRASTE ORAL TAMBÉM DEVE SER EVITADO. NECESSÁRIO ENVIO DE FEZES FRESCAS RECÉM ELIMINADAS COLETADAS EM FRASCO COLETOR LIMPO E SECO. COLETAR FRAÇÕES DE FEZES EM DIFERENTES PARTES DO BOLO FECAL.
PARASITOLÓGICO NAS FEZES - 2ª AMOSTRA	FEZES	MEDICAÇÃO: O USO DE LAXANTES É REALIZADO SOMENTE COM ORIENTAÇÃO MÉDICA E É INDICADO NOS CASOS EM QUE UMA SÉRIE DE EXAMES FOR NEGATIVO. O USO DE ANTIACIDOS E CONTRASTE ORAL TAMBÉM DEVE SER EVITADO. NECESSÁRIO ENVIO DE FEZES FRESCAS RECÉM ELIMINADAS COLETADAS EM FRASCO COLETOR LIMPO E SECO. COLETAR FRAÇÕES DE FEZES EM DIFERENTES PARTES DO BOLO FECAL.
PARASITOLÓGICO NAS FEZES - 3 AMOSTRAS	FEZES	MEDICAÇÃO: O USO DE LAXANTES É REALIZADO SOMENTE COM ORIENTAÇÃO MÉDICA E É INDICADO NOS CASOS EM QUE UMA SÉRIE DE EXAMES FOR NEGATIVO. O USO DE ANTIACIDOS E CONTRASTE ORAL TAMBÉM DEVE SER EVITADO. NECESSÁRIO ENVIO DE FEZES FRESCAS RECÉM ELIMINADAS COLETADAS EM FRASCO COLETOR LIMPO E SECO. COLETAR FRAÇÕES DE FEZES EM DIFERENTES PARTES DO BOLO FECAL.
PARVOVIRUS B19 IGG	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
PARVOVIRUS B19 IGM	SORO	INTERVALO ENTRE MAMADAS PARA LACTENTES.
PCR ULTRA SENSIVEL	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
PEPTÍDEO C	SORO CONGELADO	INTERVALO ENTRE MAMADAS PELA LACTENTES.
PESQUISA DE BK	ESCARRO	JEJUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS.
PESQUISA DE BK	DIVERSOS	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
PESQUISA DE CHLAMYDIA	SECREÇÃO URETRAL	Pela manha, após a realização da higiene bucal-oral, coletar o escarro forçando tosse diafragmática. A amostra deve ser coletada em recipiente de boca larga e estéril, preferencialmente em frascos coletores plásticos descartáveis, e encaminhada ao laboratório com a maior rapidez possível.
PESQUISA DE FUNGOS	DIVERSOS	Pela manhã, após a realização da higiene bucal-oral, coletar o escarro forçando tosse diafragmática. A amostra deve ser coletada em recipiente de boca larga e estéril, preferencialmente em frascos coletores plásticos descartáveis, e encaminhada ao laboratório com a maior rapidez possível.
PESQUISA DE SANGUE OCULTO	FEZES	1º JATO: COLHER PREFERENCIALMENTE NO LABORATÓRIO A 1º URINA DA MANHÃ. FAZER HIGIENE DA GENITÁLIA COM ÁGUA E SABÃO, SECAR, E COLETAR O 1º JATO DE URINA EM TUBO DE TRANSPORTE DE URINA. URINA JATO MÉDIO: COLHER PREFERENCIALMENTE NO LABORATÓRIO A 1º URINA DA MANHÃ OU COM INTERVALO DE 4 HORAS ENTRE AS MICÇÕES. FAZER HIGIENE DA GENITÁLIA COM ÁGUA E SABÃO, SECAR, DESPREZAR O 1º JATO DE URINA E COLETAR O JATO DO MEIO. COLHER EM FRANCO ESTÉRIL.
PESQUISA DE SANGUE OCULTO - 1ª AMOSTRA	FEZES	O PACIENTE NÃO DEVE ESTAR EM USO DE ANTIFÚNGICOS DE USO TÓPICO OU ORAL NO MOMENTO DA COLETA. APÓS O USO DESTES MEDICAMENTOS, DEVE AGUARDAR, NO MÍNIMO, 15 DIAS PARA SE REALIZE A COLETA OU CONFORME ORIENTAÇÃO DO MÉDICO. POMADAS E CREMES COMUNS (LAVAR E REALIZAR A COLETA NO DIA SEGUINTE). ESMALTE (RETIRAR E VOLTAR APÓS NO MÍNIMO 72 HORAS PARA A COLETA). UNHA COM LIMPEZA EM MANICURE E PEDICURE (AGUARDAR 15 DIAS). NÃO TOMAR BANHO NO DIA DA COLETA. NÃO LAVAR O COURO CABELUDO OU REGIÃO DA BARBA NO DIA DA COLETA. ORIENTAR O PACIENTE A LAVAR E SECAR OS PÉS NO DIA ANTERIOR À COLETA E IR AO LABORATÓRIO COM CALÇADO FECHADO. SEMPRE QUE POSSÍVEL, INFORMAR A SUSPEITA MÉDICA PARA DIRECIONAR MELHOR A PESQUISA.
		BEBIDA ALCOÓLICA: RECOMENDA-SE NÃO INGERIR BEBIDA ALCOÓLICA ANTES DA COLETA. NECESSÁRIO REALIZAÇÃO DE RESTRIÇÃO ALIMENTAR. O PACIENTE DEVE FAZER DIETA RIGOROSA POR 4 DIAS ANTES DA REALIZAÇÃO DO EXAME E NO DIA DE COLETA DE FEZES, DA QUAL SE EXCLUEM CARNES VERMELHAS, NABO, COUVE-FLOR E BROCOLIS. RECOMENDA-SE NÃO COMER BETERRABAS E CHOCOLATES. MEDICAÇÃO: EVITAR MEDICAMENTOS COMO ANTIINFLAMATÓRIOS, CORTICOIDES, ASPIRINA, COMPOSTO DE FERRO, VITAMINA C E MEDICAMENTOS QUE CAUSAM IRRITAÇÃO GASTROINTESTINAL. OUTROS: NÃO REALIZAR COLETA EM PERÍODO MENSTRUAL E EM SANGRAMENTOS DEVIDO A HEMORROIDAS.
		BEBIDA ALCOÓLICA: RECOMENDA-SE NÃO INGERIR BEBIDA ALCOÓLICA ANTES DA COLETA. NECESSÁRIO REALIZAÇÃO DE RESTRIÇÃO ALIMENTAR. O PACIENTE DEVE FAZER DIETA RIGOROSA POR 4 DIAS ANTES DA REALIZAÇÃO DO EXAME E NO DIA DE COLETA DE FEZES, DA QUAL SE EXCLUEM CARNES VERMELHAS, NABO, COUVE-FLOR E BROCOLIS. RECOMENDA-SE NÃO COMER BETERRABAS E CHOCOLATES. MEDICAÇÃO: EVITAR MEDICAMENTOS COMO ANTIINFLAMATÓRIOS, CORTICOIDES, ASPIRINA, COMPOSTO DE FERRO, VITAMINA C E MEDICAMENTOS QUE CAUSAM IRRITAÇÃO GASTROINTESTINAL. OUTROS: NÃO REALIZAR COLETA EM PERÍODO MENSTRUAL E EM SANGRAMENTOS DEVIDO A HEMORROIDAS.

PESQUISA DE SANGUE OCULTO - 2ª AMOSTRA	FEZES	BEBIDA ALCOÓLICA: RECOMENDA-SE NÃO INGERIR BEBIDA ALCOÓLICA ANTES DA COLETA. NECESSÁRIO REALIZAÇÃO DE RESTRIÇÃO ALIMENTAR. O PACIENTE DEVE FAZER DIETA RIGOROSA POR 4 DIAS ANTES DA REALIZAÇÃO DO EXAME E NO DIA DE COLETA DE FEZES, DA QUAL SE EXCLUEM CARNES VERMELHAS, NABO, COUVE-FLORES E BROCOLIS. RECOMENDA-SE NÃO COMER BETERRABAS E CHOCOLATES. MEDIÇÃO: EVITAR MEDICAMENTOS COMO ANTIINFLAMATÓRIOS, CORTICOIDES, ASPIRINA, COMPOSTO DE FERRO, VITAMINA C E MEDICAMENTOS QUE CAUSAM IRRITAÇÃO GASTROINTESTINAL. OUTROS: NÃO REALIZAR COLETA EM PERÍODO MENSTRUAL E EM SANGRAMENTOS DEVIDO A HEMORROIDAS.
PESQUISA DE SANGUE OCULTO - 3ª AMOSTRA	FEZES	BEBIDA ALCOÓLICA: RECOMENDA-SE NÃO INGERIR BEBIDA ALCOÓLICA ANTES DA COLETA. NECESSÁRIO REALIZAÇÃO DE RESTRIÇÃO ALIMENTAR. O PACIENTE DEVE FAZER DIETA RIGOROSA POR 4 DIAS ANTES DA REALIZAÇÃO DO EXAME E NO DIA DE COLETA DE FEZES, DA QUAL SE EXCLUEM CARNES VERMELHAS, NABO, COUVE-FLORES E BROCOLIS. RECOMENDA-SE NÃO COMER BETERRABAS E CHOCOLATES. MEDIÇÃO: EVITAR MEDICAMENTOS COMO ANTIINFLAMATÓRIOS, CORTICOIDES, ASPIRINA, COMPOSTO DE FERRO, VITAMINA C E MEDICAMENTOS QUE CAUSAM IRRITAÇÃO GASTROINTESTINAL. OUTROS: NÃO REALIZAR COLETA EM PERÍODO MENSTRUAL E EM SANGRAMENTOS DEVIDO A HEMORROIDAS.
PESQUISA TOXINA A E B PARA CLOSTRIDIUM NAS FEZES	FEZES	RECOMENDA-SE REALIZAR O EXAME EM AMOSTRA DE FEZES DIARREICAS OU COM CONSISTÊNCIA AMOLECIDA (SEMI-FORMADAS). ANTES DE COLETAR AS FEZES, SE NECESSÁRIO, URINAR NO VASO SANITÁRIO PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO DO MATERIAL. EM CASOS DE CRIANÇAS UTILIZAR COLETOR, SE NECESSÁRIO. EVITAR O USO DE ANTIÁCIDO, LAXANTES E DE CONTRASTE ORAL (UTILIZANDO EM EXAMES RADIOLÓGICOS) NO MÍNIMO 3 DIAS ANTES DA COLETA DAS FEZES OU CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA. DEFECAR EM VASILHAME LIMPO E SECO. MANTER AS FEZES REFRIGERADAS EM CASA E TRANSPORTAR AO LABORATÓRIO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL.
PESTICIDAS ORGANOCLORADOS E ORGANOFOSFORADOS	SANGUE (EDTA)	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
PH FECAL	FEZES	ANTES DE COLETAR AS FEZES, SE NECESSÁRIO, URINAR NO VASO SANITÁRIO PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO DO MATERIAL. EM CASO DE CRIANÇAS UTILIZAR COLETOR DE URINA, SE NECESSÁRIO. EVITAR O USO DE TALCO, LAXANTES, ANTIÁCIDOS, CONTRASTE ORAL (UTILIZADO EM EXAMES RADIOLÓGICOS) E SUPPOSITÓRIOS NOS 3 DIAS QUE ANTECEDEM AO EXAME E NO DIA DA COLETA. DEFECAR EM VASILHAME LIMPO E SECO.
PIMENTA DO CHILE	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
POTASSIO URINARIO -24HORAS	URINA (24HS)	NÃO FAZER ESFORÇO DURANTE A COLETA. O CLIENTE DEVE MANTER SUA ROTINA DIÁRIA. NÃO É NECESSÁRIO AUMENTAR A INGESTÃO DE LÍQUIDOS, EXCETO SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA. A HIGIENIZAÇÃO DA GENITÁLIA É REALIZADA COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO. NAS MULHERES, LAVAR E SECAR SEMPRE DE FRENTE PRA TRÁS. NOS HOMENS LAVAR RETRAINDO O PREPÚCIO PARA UMA ADEQUADA LIMPEZA DO MEATO URETRAL.
PROGESTERONA	SORO	JEJUM DESEJAVEL DE 4 HORAS.
PROLACTINA	SORO	Jejum de 4 horas.
PROPORÇÃO OMEGA 3 E 6	SANGUE TOTA(EDTA) AMBAR	JEJUM NÃO NECESSÁRIO.
PROTEÍNA C	PLASMA (CITRATO CONGELADO)	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
PROTEINA C REATIVA - PCR	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
PROTEINA S FUNCIONAL	PLASMA (CITRATO CONGELADO)	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
PROTEINAS TOTAIS (PESQUISA E/OU DOSAGEM)	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
PROTEINAS TOTAIS E FRAÇÕES (ALBUMINA E GLOBULINA)	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
PROTEINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)	URINA	Fazer a higiene local, desprezar o primeiro jato e colher o jato intermediário, da primeira urina da manhã.
PROTEINURIA 24 HORAS	URINA (24HS)	INFORMAR VOLUME URINÁRIO, HORÁRIO INICIAL E FINAL DA COLETA. NÃO FAZER ESFORÇO FÍSICO DURANTE A COLETA. O CLIENTE DEVE MANTER SUA ROTINA DIÁRIA. NÃO É NECESSÁRIO AUMENTAR A INGESTÃO DE LÍQUIDOS, EXCETO SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA. MULHERES: NÃO REALIZAR A COLETA DE URINA NO PERÍODO MENSTRUAL. A HIGIENIZAÇÃO DA GENITÁLIA É REALIZADA COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO. NAS MULHERES, LAVAR E SECAR SEMPRE DE FRENTE PRA TRÁS. NOS HOMENS, LAVAR RETRAINDO O PREPÚCIO PARA CADA ADEQUADA LIMPEZA DO MEATO URETRAL. REFRIGERAR A URINA DESDE O INÍCIO DA COLETA. INFORMAR TODO O VOLUME URINARIO COLETADO NO PERÍODO DE 24 HORAS.
PROTEINURIA 24 HS (AMOSTRA ISOLADA)	URINA	Fazer a higiene local, desprezar o primeiro jato e colher o jato intermediário, da primeira urina da manhã.
PSA LIVRE	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
PSA TOTAL	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
QUANTIFICAÇÃO DE LINFOCITOS CD4+CD8	SANGUE (EDTA)	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
RELAÇÃO PROTEINA/CREATININA	URINA	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO. HIGIENIZAR A REGIÃO GENITAL E COLHER, PREFERENCIALMENTE, A PRIMEIRA URINA DA MANHÃ OU COM INTERVALO MÍNIMO DE 04 HORAS APÓS A ÚLTIMA MICÇÃO. DESPREZAR O PRIMEIRO JATO DE URINA, E SEM INTERROMPER A MICÇÃO, COLETAR O SEGUNDO JATO.
RENINA	PLASMA (EDTA)	JEJUM ACONSELHAVEL DE 4 HORAS.
RETICULÓCITOS	SANGUE (EDTA)	<del>EXERCÍCIOS: EVITAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS</del> JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
RETRAÇÃO DO COAGULO	PLASMA (EDTA)	JEJUM DESEJAVEL DE 4 HORAS.
ROTINA DE URINA	URINA - JATO MÉDIO	COLHER PREFERENCIALMENTE NO LABORATÓRIO A 1ª URINA DA MANHÃ OU COM INTERVALO DE 4 HORAS ENTRE AS MICÇÕES.
ROTINA DE URINA	URINA - JATO MÉDIO	FAZER HIGIENE DA GENITÁLIA COM ÁGUA E SABÃO. SECAR PRÓPRIO LABORATÓRIO TOMANDO CUIDADOS ESPECIAIS COM ASSEPSIA. COLETA COM COLETOR DE URINA INFANTIL. SOMENTE REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO LABORATÓRIO.
RUBÉOLA - IGG	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.

RUBÉOLA - IGM	SORO	JEIUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS. INTERVALO ENTRE MAMADAS PARA LACTANTES.
SARAMPO - ANTICORPOS IGG	SORO	JEIUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
SARAMPO - ANTICORPOS IGM	SORO	JEIUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
S-DHEA	SORO	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
SELENIO SERICO	SORO (TUBO TRACE)	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
SEROTONINA	SORO CONGELADO	JEIUM OBRIGATORIO DE 8 HORAS. O PACIENTE DEVERÁ PERMANECER 24 HORAS SEM INGERIR OS ALIMENTOS RELACIONADOS, POIS ESTES INTERFEREM NO RESULTADO: ABACATE, AMEIXA, BANANA, BERINGELA, CHOCOLATE, FRUTOS SECOS, MEXILHÕES, NOZES, PICKLES, TOMATE. O PACIENTE DEVERÁ PERMANECER 7 DIAS SEM INGERIR OS SEGUINTE MEDICAMENTOS CONFORME ORIENTAÇÃO DO SEU MÉDICO: PARACETAMOL, GUAFENESIN, IMIPRAMINA, INIBIDORES DA MAO, LÍTIQ, METILDOPA, MORFINA, NAPROXENO (NAPROSYN), RESERPINA.
SÍFILIS - FTA-ABS-IGG	SORO	JEIUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS.
SÍFILIS - FTA-ABS-IGM	SORO	JEIUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS.
SODIO	SORO	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
SODIO - URINA 24 HORAS	URINA (24HS)	NÃO FAZER ESFORÇO FÍSICO DURANTE A COLETA. O CLIENTE DEVE MANTER SUA ROTINA DIÁRIA.
SODIO AMOSTRA ISOLADA	URINA	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
SOROLOGIA PARA DENGUE	SORO	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
SUBSTÂNCIAS REDUTORAS NAS FEZES	FEZES	Coletar as fezes em um local seco (jornal, pinico), retirar pequenas amostras de pelo menos 3 locais diferentes e colocar no frasco fornecido pelo Laboratório.
T3 LIVRE	SORO	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
T3 REVERSO	SORO CONGELADO	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO DE 4 HORAS.
T4 - TIROXINA	SORO	JEIUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS.
T4 LIVRE	SORO	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO. INFORMAR MEDICAMENTOS EM USO OU USADOS RECENTEMENTE, INCLUSIVE FORMULAS PARA EMAGRECER (TRIOLSTAT, THEVIER). SE MULHER INFORMAR SE ESTA GRÁVIDA OU SE USA ANTICONCEPCIONAL. SUGERE-SE (NÃO É OBRIGATÓRIO) QUE A AMOSTRA SEJA COLHIDA ANTES DA
TBG - GLOBULINA LIGADORA DE TIROXINA	SORO	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
TEMPO DE PROTROMBINA	PLASMA (CITRATO)	JEIUM DESEJÁVEL DE 4 HORAS.
TEMPO DE SANGRAMENTO	SANGUE	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
TESTE DA MUTAÇÃO G20210A NO GENE DA PROTROMBINA	SANGUE (EDTA)	JEIUM NÃO NECESSÁRIO.
TESTE DE FALCIZACAÇÃO	SANGUE	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
TESTE DE NEUTRALIZAÇÃO SARS-COV-2/COVID19, ANTICORPOS TOTAIS - SORO	SORO	RECOMENDA-SE COLETA APÓS 15 DIAS DO INÍCIO DOS SINTOMAS OU DA CONFIRMAÇÃO DA INFECÇÃO POR RT-PCR, OU 21 DIAS APÓS VACINAÇÃO.
TESTE DE PATERNIDADE	SANGUE	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
TESTE DE TOLERANCIA A LACTOSE	SORO	ADULTOS: JEIUM MÍNIMO DE 8 HORAS E MÁXIMO DE 14 HORAS. CRIANÇAS: ATÉ 3 ANOS: MAIOR INTERVALO ENTRE AS MAMADAS. DE 3 A 5 ANOS: JEIUM OBRIGATÓRIO DE 4 HORAS. MAIORES DE 5 ANOS: JEIUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS (IGUAL A ADULTO).
TESTE DO PEZINHO	DIVERSOS	JEIUM: INTERVALO MÁXIMO ENTRE AS MAMADAS.
TESTE GENÉTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE	SANGUE (EDTA)	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
TESTE ORAL DE TOLERANCIA A GLICOSE	SORO	JEIUM OBRIGATÓRIO: 8 A 14 HORAS OU CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA. EM CASO DE CRIANÇAS, SEGUIR ORIENTAÇÃO MÉDICA.
TESTOSTERONA BIODISPONÍVEL	SORO	JEIUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS.
TESTOSTERONA BIODISPONÍVEL	SORO	JEIUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS.
TESTOSTERONA LIVRE	SORO	JEIUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS.
TESTOSTERONA TOTAL	SORO	JEIUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS.
TETANO IGG ANTICORPOS	SORO	JEIUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
TGO	SORO	JEIUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS.
TIPAGEM DE LINFÓCITOS CD3, CD4, CD8 E CD19	SANGUE (EDTA)	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
TIREOGLOBULINA	SORO	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO. INFORMAR MEDICAMENTO EM USO. SE MULHER INFORMAR SE ESTA GRÁVIDA OU SE USA ANTICONCEPCIONAL. INFORMAR SE JÁ REALIZOU CIRURGIA DE TIREÓIDE E HÁ QUANTO TEMPO
TIROSINA	SORO (TUBO TRACE)	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
TOXICOLOGICO	PELO OU CABELO	PACIENTE DEVERÁ INFORMAR O USO DE MEDICAMENTOS, TRAZER CNH E DOCUMENTOS
TOXOCARIASE IGG	SORO	JEIUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
TOXOPLASMOSE IGG	SORO	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
TOXOPLASMOSE IGM	SORO	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
TPHA SIFILIS	SORO	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
TRANSFERRINA	SORO	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
TRIGLICÉRIDEOS	SORO	BEBIDAS ALCOOLICAS: A ABSTINENCIA E DESEJAVEL NAS 72 HORAS QUE ANTECEDEM O TESTE. JEIUM SUGERIDO DE 12 HORAS. EM CASOS DE TEMPOS ESPECIFICOS OU SEM JEIUM, VEJA O CRITÉRIO MÉDICO OU POLÍTICA DO LABORATÓRIO.
TRIIODOTIRONINA (T3)	SORO	JEIUM DESEJAVEL DE 4 HORAS.
TRIPSINA NEONATAL	SANGUE EM PAPEL FILTRO	JEIUM: INTERVALO ENTRE AS MAMADAS.
TROPONINA I (QUALITATIVA)	SANGUE	JEIUM NÃO NECESSÁRIO.
TROPONINA I (QUANTITATIVA)	SANGUE (EDTA)	JEIUM NÃO OBRIGATÓRIO.
TSH	SORO	JEIUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS.

TSH (TRAB)	SORO	JEJUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS.
TSH NEONATAL	SANGUE EM PAPEL FILTRO	JEJUM; INTERVALO ENTRE AS MAMADAS.
TTPA	PLASMA (CITRATO)	JEJUM DESEJÁVEL DE 4 HORAS. INFORMAR SE ESTA OU ESTEVE RECENTEMENTE EM USO DE ANTICOAGULANTE E QUAL A DOSAGEM (CLEXANE, HEPARINA, HIRUDOID, LIQUEMINE, MARCOUMAR E MAREVAN).
TUBERCULOSE IGG	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS. INTERVALO ENTRE MAMADAS PARA LACTENTES.
TUBERCULOSE IGM	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS. INTERVALO ENTRE MAMADAS PARA LACTENTES.
UREIA	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
UREIA 24 HORAS	URINA (24HS)	REFRIGERAR A URINA DESDE O INÍCIO DA COLETA. NÃO FAZER ESFORÇO FÍSICO DURANTE A COLETA.
UREIA PÓS	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
UROCULTURA	URINA - JATO MÉDIO	COLETER PREFERENCIALMENTE NO LABORATÓRIO A 1ª URINA DA MANHÃ OU COM INTERVALO DE 4 HORAS ENTRE AS MICÇÕES. FAZER HIGIENE DA GENTILIA COM ÁGUA E
UROPORFIRINAS URINARIAS	URINA/AMBAR/CONGELADO	COLHER A 1ª URINA DA MANHÃ OU URINA COM O MÍNIMO DE 4 HORAS DE RETENÇÃO URINÁRIA. FAZER HIGIENE LOCAL COM ÁGUA E SABÃO, DESPREZAR O 1º JATO E COLETAR O JATO DO MEIO. UTILIZAR FRASCO PROTEJIDO DA LUZ (ÂMBAR).
VARICELLA ZOSTER -IGG	SORO	JEJUM ACONSELHÁVEL DE 4 HORAS.
VASOPRESSINA - HORMÔNIO ANTIURÉTICO	PLASMA (EDTA)	JEJUM DE NO MÍNIMO 12 HORAS.
VDRL	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS. INTERVALO ENTRE MAMADAS PARA LACTENTES.
VHS (HEMOSEDIMENTAÇÃO)	SANGUE (EDTA)	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
VITAMINA A	SORO CONGELADO AMBAR	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS. INFORMAR MEDICAMENTO EM USO.
VITAMINA B1	SANGUE TOTAL (EDTA) AMBAR	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.
VITAMINA B12	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
VITAMINA B2	SANGUE (EDTA)	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS. INFORMAR MEDICAMENTOS EM USO, INCLUSIVE VITAMINAS.
VITAMINA B2	PLASMA (HEPARINA SODICA) AMBAR	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS. INFORMAR MEDICAMENTOS EM USO, INCLUSIVE VITAMINAS.
VITAMINA B3	SANGUE (EDTA)	JEJUM DESEJÁVEL DE 4 HORAS.
VITAMINA D	SORO	JEJUM NÃO RECOMENDADO.
VITAMINA E	SORO CONGELADO AMBAR	JEJUM OBRIGATÓRIO 8 HORAS.
VITAMINA K	SORO CONGELADO AMBAR	JEJUM ADULTO: JEJUM OBRIGATÓRIO DE 12 HORAS. JEJUM CRIANÇA: ATÉ 1 ANO DE IDADE, JEJUM MÍNIMO NECESSÁRIO DE 3 HORAS. DE 1 A 5 ANOS DE IDADE, JEJUM MÍNIMO NECESSÁRIO DE 6 HORAS. ACIMA DE 5 ANOS DE IDADE, JEJUM IGUAL AO DE ADULTO. INFORMAR MEDICAMENTO EM USO. NÃO INGERIR BEBIDA ALCOÓLICA NAS ÚLTIMAS 24 HORAS.
WAALER-ROSE (FATOR REUMATÓIDE)	SORO	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS. INTERVALOS ENTRE MAMADAS PARA LACTENTES.
WESTERN BLOT (ANTICORPOS ANTI -HIV)	SORO	JEJUM NÃO OBRIGATÓRIO.
ZIKA IGG	SORO	JEJUM OBRIGATORIO DE 8 HORAS.
ZIKA IGM	SORO	JEJUM OBRIGATORIO DE 8 HORAS.
ZINCO	SORO (TUBO TRACE)	JEJUM OBRIGATÓRIO DE 8 HORAS.